

Una nueva especie del género *Naxa* Walker, 1856, de las montañas Arfak, Papúa Occidental (Indonesia) (Lepidoptera: Geometridae, Orthostixinae)

A. Expósito-Hermosa

Resumen

Se describe *Naxa galae* Expósito, sp. n., con ejemplares de las montañas Arfak, Papúa Occidental (Indonesia). Se proporcionan imágenes de los adultos y de la genitalia del macho y de la hembra.

PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Geometridae, Orthostixinae, *Naxa*, especie nueva, Papúa Occidental, Indonesia.

**A new species of the genus *Naxa* Walker, 1856 from the Arfak Mountains, West Papua (Indonesia)
(Lepidoptera: Geometridae, Orthostixinae)**

Abstract

It is described *Naxa galae* Expósito, sp. n., with exemplars of Arfak Mountains, West Papua (Indonesia). Images of the adults and the corresponding genitalia male and female are provided.

KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Orthostixinae, *Naxa*, new species, West Papua, Indonesia.

Introducción

Naxa craspedota Prout, 1924 es la única especie representada de la subfamilia Orthostixinae, descrita de Papúa Occidental (Irian Jaya). Esta especie muestra una morfología externa muy diferente a la de una serie de ejemplares de las montañas Arfak que hemos estudiado. Dichos ejemplares se asemejan mucho más a *Naxa guttulata* Warren, 1894, descrita de Borneo, y *N. kerangatis* Holloway, 1996, descrita de Sarawak, que a *N. craspedota*. Por lo que seguidamente se procede a su estudio y a describirla como una especie nueva.

Abreviaturas usadas

AEH Colección de Andrés Expósito Hermosa. Móstoles (Madrid), España.

Resultados

Naxa galae Expósito, sp. n.

Holotipo ♀: INDONESIA; W.[est] Papua, Arfak Mts. Maybri Vil. +/-1.670 m XI-2019 colector local.
Paratipos: INDONESIA; W.[est] Papua, Arfak Mts. Maybri Vil. +/-1.670 m, 1 ♂, XI-2019 colector local

(preparación de genitalia AEH3428); 2 ♀♀, (preparación de genitalia AEH3429). Todos los ejemplares y preparaciones de genitalia quedan depositados en la colección del autor AEH, Móstoles, Madrid (España).

Descripción: (Figs 1-4): La expansión alar del ♂ es de 43 mm y de la ♀ de 51-57 mm. La morfología externa, tanto del macho como de las hembras es muy similar. Fondo de las alas de tono blanco/grisáceo-translúcido; la fila de manchas redondeadas en el área subterminal coinciden con los nervios; la que está en la costa de las alas anteriores es la que resalta más. La fila de manchas del termen es paralela a la anterior y están ubicadas entre los nervios. En la zona basal de la costa se aprecia un trazo negro. La mancha apical de ambas alas es mayor que el resto de ellas y está algo difuminada. Además, existen puntos adicionales en las alas anteriores coincidiendo con la zona mediana de las venas A, Cu y R. El reverso es semejante, pero con las manchas menos marcadas. En las alas posteriores la vena $M_2=5$ está presente. Antenas bipectinadas con los flagelos del ♂ algo mayores que en los de la ♀. Tórax con las dos manchas negras cerca de la cabeza. Resto del cuerpo algo más oscuro que el fondo de las alas.

Genitalia del macho (Fig. 5): Semejante a *N. guttulata* Warren, 1894 y *N. kerangatis* Holloway, 1996, pero el uncus es más puntiagudo. La valva tiene la costa fuertemente convexa, más que en *N. kerangatis*, y la zona apical no es redondeada sino que es aguda. Juxta bífida y apicalmente asimétrica, con sus brazos finos y puntiagudos (no romos), siendo el derecho más largo. Aedeagus delgado, la vesica sin cornuti con un uniforme proceso de pequeñas partículas (escobinado) central. El octavo tergito poco significativo.

Genitalia de la hembra (Fig. 6): Semejante a *N. kerangatis* Holloway, 1996, pero con diferencias en el sterigma que es más corto y ancho, lo que hace más visible el proceso en forma de púa de su parte central en el colliculum. La bursa copulatrix es más redondeada y el signum es muy poco significativo.

Distribución: Sólo se la conoce de Papúa Occidental (Irian Jaya), de las montañas Arfak, Maybri Vil, Indonesia.

Etimología: Se dedica esta especie nueva a la nieta del autor Gala Expósito Fernández y se la denomina *galae*.

Agradecimientos

Al Dr. Antonio Vives Moreno por su siempre muy estimada ayuda.

BIBLIOGRAFÍA


- HOLLOWAY, J. D., 1996.— The Moths of Borneo, part 9: Geometridae, Geometridae (Incl. Orthostixini) Oenochrominae, Desmobathrinae, Geometrinae, Ennominae addenda.— *Malayan Nature Journal*, **49**: 147-326, 12 pls.
- PROUT, L. B., 1924.— New Geometridae from Dutch New Guinea and Mefor Island.— *Bulletin of the Hill Museum*, **1**: 456-476, pls. XXIII-XXIV.
- WALKER, F., 1856- Catalogue of Lepidoptera Heterocera.— *List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the of the British Museum*, **7**: 1510-1808.
- WARREN, W., 1894.— New Genera and Species of Geometridae.— *Novitates Zoologicae*, **1**: 366-534.

A. E. H.
Gardenia, 25
E-28933 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA / SPAIN
E-mail: aexposih@telefonica.net
<https://orcid.org/0000-0003-4475-4974>

(Recibido para publicación / Received for publication 1-VII-2020)

(Revisado y aceptado / Revised and accepted 24-VII-2020)

(Publicado / Published 30-XII-2020)



Figs 1-6.— *Naxa galae* Expósito, sp. n., W. Papua, Arfak Mts., Maybri Vil. +/-1.670 m, XI-2019, Indonesia. **1.** Paratipo ♂ Anverso. **2.** Reverso. **3.** Holotipo ♀ Anverso. **4.** Reverso. **5.** Paratipo ♂ Preparación de Genitalia AEH3428. **6.** Paratipo ♀ Preparación de Genitalia AEH3429. (Escala 1 cm).