

REVISIÓN DE PUBLICACIONES *BOOK REVIEWS*

L. Aarvick, B. Å. Bengtsson, H. Elven, P. Ivinski, U. Jürivete, O. Karsholt,
M. Mutanen & N. Savenko
Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera
236 páginas
Formato: 24,5 x 17,5 cm
07 Gruppen, Oslo, 2017
ISSN (Impreso): 2535-2768
ISSN (Electrónico): 2535-2784

En el suplemento número 3 de la revista *Norwegian Journal of Entomology*, aparece esta lista comentada de los Lepidoptera que están presentes en los países nórdicos, concretamente en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia; si bien a lo largo de la historia han ido apareciendo catálogos individuales para estos países, es la primera vez que se tratan conjuntamente y para ello ha contado con los mejores especialistas conocedores de sus respectivas faunas.

La obra comienza con una Introducción, seguida de la sistemática y taxonomía, la filogenia y las altas categorías de los Lepidoptera. Nos hablan de los grandes naturalistas nórdicos en los siglos XVIII empezando por Linnaeus (1707-1771) y seguidos por sus discípulos y colaboradores como Clerck (1710-1765), Thunberg (1743-1828) y Fabricius (1745-1808), continuando con los principales trabajos publicados en los diferentes países nórdicos.

La parte principal del libro es el listado de toda la fauna conocida de los Lepidoptera, presentes en cada uno de los países considerados, así tenemos que en Dinamarca hay 2.583 especies, Estonia con 2.454 especies, Finlandia con 2.588 especies, Islandia con 96 especies, Letonia con 2.556 especies, Lituania con 2.423 especies, Noruega con 2.286 especies y Suecia con 2.804 especies, teniendo un total de 3.259 especies que se encontraría en el área de estudio.

Con motivo de la elaboración de esta lista, se aportan los siguientes resultados, con las siguientes nuevas sinonimias: *Phyllo-norycter heringiella* (Grønlien, 1932) de *P. salictella* (Zeller, 1846) y *P. brevilineatella* (Benander, 1944) de *P. salicicolella* (Sircom, 1848); *Syncopaema Meyrick*, 1925 es sinonimia de *Approaerema* Durrant, 1897. Con las consiguientes nuevas combinaciones: *Caryocolum arenariella* (Benander, 1937) se considera como una subespecie de *C. schleichi* (Christoph, 1872); *Entephria byssata* (Aurivillius, 1891) se considera como una especie válida distinta de la especie Neártica *E. punctipes* (Curtis, 1835) y *Cosmia contusa* (Freyer, 1849) es transferida desde el género *Ipimorpha* Hübner, [1821] a *Cosmia* Ochseneheimer, 1816.

La obra termina con unos e interesantes comentarios aclaratorios sobre las especies o el estatus más problemático, seguido de una detallada bibliografía y de un índice.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por un detallado y excelente resultado fruto de una muy buena colaboración entre los autores de los diferentes países involucrados, así como felicitar también a la *Norwegian Entomological Society*, por haber llevado a buen fin este proyecto.

Este libro se puede obtener electrónicamente (<http://www.entomologi.no>) y en soporte papel y los interesados deben dirigirse a:

Norwegian Entomological Society
At. Lars Ove Hansen
Naturhistorisk Museum
Universitetet I Oslo
Postboks 1172 Blindern
NO-0318 Oslo
NORUEGA / NORWAY

