

# Variación temporal del ensamblaje de mariposas asociadas a la Cuenca de la Calabozza, Yopal, Casanare, Colombia (Lepidoptera: Papilionoidea)

P. Urbano, O. Mahecha-J., E. Suárez, V. Izquierdo & V. Díaz-S.

## Resumen

La variación estacional puede afectar tanto a la estructura del hábitat como a la disponibilidad de recursos, lo que puede generar diferentes respuestas de las especies animales como las mariposas. Por tal razón, se planteó evaluar el efecto de la variación temporal en el ensamblaje de mariposas en la cuenca de la Calabozza, Casanare, Colombia, teniendo dos épocas de muestreo: Bajas lluvias y altas lluvias y empleando métodos de recolecta activos y pasivos planteados para el estudio de mariposas. Se logró evidenciar una variación en la composición, abundancia y riqueza de mariposas a lo largo del muestreo, en donde la familia Nymphalidae presentó mayor diversidad tanto para la época de altas y bajas lluvias seguido de Pieridae. Por su parte, Lycaenidae y Riodinidae presentaron los menores valores de abundancia y riqueza en ambas épocas de muestreo. Se observó una variación en la composición de las especies de mariposas por época de muestreo, en donde *Pyrgus orcus* (Stoll, 1780), *Memphis ambrosia* (Druce, 1874), *Eresia clara* (Linnaeus, 1758), *Cissia tiessa* (Doubleday, 1848), *Euptoieta claudia* (Cramer, 1775), *Taygetis rufomarginata* (Staudinger, 1888), *Aphrissa statira* (Cramer, 1777), *Melete polyhymnia* (Felder & Felder, 1865) y *Hypoleria ocalea* (Doubleday, 1847), fueron exclusivas de época de bajas lluvias, mientras que *Pyrgus oileus* (Linnaeus, 1767), *Eueides lybia* (Fabricius, 1775), *Itaballia demophile* (Linnaeus, 1763), *Dircenna dero* (Hübner, 1823), *Hamadryas arinome* (Lucas, 1853), *Taygetis andromeda* (Butler, 1877), *Eunica malvina* (Bates, 1864), *Posttaygetis penelea* (Cramer, 1777), entre otras, fueron especies exclusivas de la época de Altas Lluvias. Se evidenció que especies como *Historis acheronta* (Fabricius, 1775) y *Heliconius erato* (Linnaeus, 1758) fueron co-dominantes, tanto para la época de bajas como de altas lluvias. Estos resultados, indican que a nivel de cuenca existen condiciones ecosistémicas que soportan los requerimientos biológicos para la supervivencia de la comunidad de mariposas, a pesar de la especificidad en la presencia de algunas especies por época climática, se reporta una alta diversidad de especies en el área de estudio importantes para el equilibrio ecosistémico, por lo que la Calabozza se convierte en un área de importancia para conservación a nivel de piedemonte en la región de la Orinoquia colombiana.

PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Papilionoidea, Piedemonte, comunidad, diversidad, conservación, Colombia.

## Temporal variation of the assemblages of butterflies associated with the La Calabozza, Yopal, Casanare, Colombia (Lepidoptera: Papilionoidea)

## Abstract

Temporal variation can affect the structure of the habitat and the availability of resources, which can generate different responses of animal species such as butterflies. For this reason, we were proposed to evaluate the effect of the temporal variation in the assembly of butterflies in the Calabozza, Casanare, Colombia, having two sampling periods: Low Rains and High Rains and using active and passive collection methods proposed for the study of butterflies. It was possible to show a variation in the composition, abundance and richness of butterflies throughout the sampling, where the Nymphalidae family presented greater diversity for both the High and Low Rainy seasons

followed by Pieridae family. On the other hand, Lycaenidae and Riodinidae presented the lowest values of abundance and wealth in both sampling seasons. A variation in the composition of the butterflies species was observed by sampling period, where *Pyrgus orcus* (Stoll, 1780), *Memphis ambrosia* (Druce, 1874), *Eresia clara* (Linnaeus, 1758), *Cissia tiessa* (Doubleday, 1848), *Euptoieta claudia* (Cramer, 1775), *Taygetis rufomarginata* (Staudinger, 1888), *Aphrissa statira* (Cramer, 1777), *Melete polyhymnia* (Felder & Felder, 1865) and *Hypoleria ocalea* (Doubleday, 1847), were exclusive of low rains period, while *Pyrgus oileus* (Linnaeus, 1767), *Eueides lybia* (Fabricius, 1775), *Itaballia demophile* (Linnaeus, 1763), *Dircenna dero* (Hübner, 1823), *Hamadryas arinome* (Lucas, 1853), *Taygetis andromeda* (Butler, 1877), *Eunica malvina* (Bates, 1864), *Posttaygetis penelea* (Cramer, 1777), among others, were exclusive species of the High Rainy season. We were evidenced that species such as *Historis acheronta* (Fabricius, 1775) and *Heliconius erato* (Linnaeus, 1758) were co-dominant for both the Low season and the High Rainy season. These results indicate that there are ecosystem conditions that support the biological requirements for the survival of the butterflies' community, despite the specific nature of the presence of some species by climate season; a high diversity of species is reported. Important study area for the ecosystem equilibrium, so the Calabozza becomes an area of importance for conservation at piedmont level in the region of the Colombian Orinoquia.

KEY WORDS: Lepidoptera, Papilionoidea, Piedmont, community, diversity, conservation, Colombia.

## Introducción

En el Neotrópico, Colombia es considerado uno de los países más megadiversos con una gran variedad de especies tanto de animales como de vegetales (ANDRADE-C., 2011; URBANO *et al.*, 2014; MAHECHA-J. & DÍAZ-S., 2015). No obstante, esta biodiversidad está siendo amenazada constantemente por los altos niveles de deforestación dado los crecientes eventos de transformación de los ecosistemas naturales (VAN DERHAMMEN & ANDRADE, 2003; RUDAS *et al.*, 2007; MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; URBANO *et al.*, 2014).

Los eventos de transformación están relacionados a procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola, minera y ganadera (SANTOS & TELLERIA, 2006; URBANO *et al.*, 2014). Estos procesos han contribuido a la pérdida de alrededor del 40% de la cobertura original del país, en donde la región andina ha sido la más afectada en términos de pérdida de biodiversidad en todos sus niveles: Riqueza de Especies, Ecosistémico y Genético (ANDRADE-C., 2011; URBANO *et al.*, 2014). En este orden de ideas, la intrusión de especies foráneas o exóticas y la sobre-explotación de los recursos naturales han contribuido en gran parte a la pérdida de diversidad biológica en varias regiones geográficas de Colombia (BAPTISTE *et al.*, 2010), en espacial ocasionando la pérdida de especies endémicas y la disminución de grupos taxonómicos sensibles a cambios ambientales, como los son los Lepidoptera (MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; TINAJERO & RODRÍGUEZ-ESTRELLA, 2012; URBANO *et al.*, 2014;).

Estudios han demostrado que las mariposas son muy sensibles a la fluctuación de variables ambientales como la temperatura, la estacionalidad, humedad relativa y radiación solar, entre otros (BROWN, 1991; MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; MAHECHA-J. & DÍAZ-S., 2015). Esta sensibilidad obedece a una respuesta comportamental y ecológica frente a las perturbaciones del hábitat generados por eventos antrópicos (GUERRA-SERRUDO & LEDEZMA-ARIAS, 2008; URBANO *et al.*, 2014). Además, la sensibilidad de las mariposas a cambios ambientales y del paisaje, está relacionado con su ciclo de vida por las fuertes asociaciones de sus estados larvales a grupos particulares de plantas (GREENEY *et al.*, 2009). Por lo anterior, las mariposas son considerados bioindicadores del estado de conservación del ecosistema, y al mismo tiempo, por presentar variabilidad espacio-temporal, por lo que suelen ser usados como modelos en estudios sobre variación temporal (FAGUA *et al.*, 1999; GONZÁLEZ-VALDIVIA *et al.*, 2011; URBANO *et al.*, 2014; MAHECHA-J. & DÍAZ-S., 2015; ISERHARD *et al.*, 2017).

La variación estacional o temporal puede afectar tanto a la estructura del hábitat como a la disponibilidad de recursos, lo que puede generar diferentes respuestas de las especies de mariposas y de otros grupos de animales como las aves (CODESIDO & BILENCA, 2004). Por ejemplo, algunas de estas respuestas pueden ser los cambios en la composición específica del ensamblaje de mariposas y las variaciones en abundancia de sus poblaciones (CODESIDO & BILENCA, 2004). A su vez, la actividad estacional de los insectos es un fenómeno que ha sido registrado muchas veces en ecosistemas tropicales donde hay una clara alternancia de una época seca y una húmeda (WOLDA, 1978; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et*

*al.*, 2009). Sin embargo, esta estacionalidad puede variar según el grupo taxonómico que se esté estudiando y en general cada patrón representa una solución diferente de cada especie a las limitaciones locales en las condiciones bióticas y abióticas limitantes para cada especie (PESCADOR *et al.*, 2002; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009; ISERHARD *et al.*, 2017), dando lugar a una gran variedad de patrones temporales o estacionales de diversidad (KATO *et al.*, 1995; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009).

Sin embargo, aún hacen falta estudios sobre varios temas biológicos, como por ejemplo en diversidad, biogeografía, sistemática, entre otros, concernientes a las mariposas en muchas regiones de Colombia, principalmente en aquellas áreas como el piedemonte y sabanas inundables de la Orinoquia, las cuales en los últimos años, han sido afectados por diferentes procesos antrópicos que ha llevado a la fragmentación del hábitat, como por ejemplo, actividades de minería, agricultura, ganadería extensiva, etc. (URBANO *et al.*, 2014), además, la carencia de estudios sobre diversidad en la zona origina un desconocimiento de cómo diversos grupos animales, como las mariposas, responden a cambios ambientales y cómo estos cambios pueden afectar la estructura de los diferentes ensamblajes presentes en estas áreas del país, ejemplo de estos cambios ambientales tiene que ver con el conocimiento de los patrones de diversidad temporal, la cual permite una mejor comprensión de la ocurrencia y distribución de las especies en una comunidad, igualmente, la variación temporal influye en la fluctuación y modificación de las comunidades a través del tiempo permitiendo describir con precisión los patrones que dan forma a la diversidad y distribución de la fauna en un área determinada (ISERHARD *et al.*, 2017). Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la variación temporal del ensamblaje de mariposas asociadas a la Cuenca de la Calabaza, Yopal, Casanare, Colombia. Además, de aportar al conocimiento de las especies de mariposas del departamento de Casanare.


## Materiales y Métodos

### ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en la cuenca la Calabaza del municipio de Yopal Casanare, la cual comprende un ecosistema de bosque húmedo tropical sobre el piedemonte llanero de la cordillera oriental de Colombia (ROMERO *et al.*, 2004). Esta cuenca presenta una altitud que va desde los 350 msnm hasta los 970 msnm y una precipitación media anual de 2.100 a 4.200 mm con un periodo de altas lluvias entre los meses de abril a octubre y un periodo de bajas lluvias entre los meses de noviembre a marzo. La topografía de la cuenca es típica de piedemonte llanero la cual está conformada, por diferentes tipos de suelos que se han originado gracias a la interacción que existe entre factores tales como la vegetación, el clima y la formación geológica de las rocas, causando dicha interacción suelos compuestos de hierro y aluminio, lo cual ostenta de superficies acidas al territorio. Está ubicada a 5 km al norte del casco urbano del municipio de Yopal (N: 5° 37' 09"; W: 72° 41' 81") y tiene un área de 345 hectáreas donde predominan zonas abiertas de pastizales naturales e intervenidos y relictos boscosos sobre el margen del cuerpo de agua (Figura 1).

### FASE DE CAMPO

La fase de campo se llevó a cabo en los meses de V-VII-2016, que correspondió a la época de lluvia, y del mes XI-XII-2016 y I-2017, la cual consistió a la época de bajas lluvias. Para la recolección de los ejemplares se realizaron 6 salidas de campo de 5 días/mes cada una, en donde se utilizaron trampas Van Someren Rydon (VSR) en transectos de 300 metros cada uno sobre el margen del caudal, tanto en la cuenca alta como media y baja, sobre dichos transectos se colocaron 7 trampas distanciadas 50 metros una de la otra, las cuales se revisaron diariamente para el registro de ejemplares recolectados por trampa y por transecto. Las trampas fueron cebadas con fruta fermentada y excremento humano. Adicionalmente, se establecieron transectos paralelos en áreas abiertas o pastizales adyacentes, en los cuales se aplicó la metodología de captura con red lepidopterológica (jama) durante los 4 días por mes y logrando una intensidad de 132 horas/hombre por muestreo mensual.



**Figura 1.**– Ubicación geográfica de la Quebrada La Calaboz, en el municipio de Yopal Casanare, Colombia. El asterisco indica el delta de la quebrada sobre el río Cravo Sur y la ubicación de la Cabecera Municipal de Yopal.

#### DETERMINACIÓN TAXONÓMICA

Los individuos recolectados fueron procesados siguiendo el protocolo de ANDRADE-C *et al.* (2013) y fueron depositados en la colección de referencia de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) en Colombia. Se analizaron caracteres morfológicos como patrones alares, patrones de coloración y genitales del macho. Para la determinación taxonómica se utilizaron las claves de LECROM *et al.* (2002, 2004) y NEILD (1996, 2008). Adicionalmente, se contó con la colaboración de especialistas en algunos grupos de mariposas y su identificación fue contrastada con la lista para Lepidoptera neotropicales de LAMAS (2004) y la base de datos de WARREN *et al.* (2013).


#### ANÁLISIS DE DATOS

Se obtuvieron los índices de diversidad alfa y beta en términos de números equivalentes o números de Hill para la época de bajas lluvias y de altas lluvias. Estos números se calcularon en tres órdenes de diversi-


dad; la diversidad en orden H0 (riqueza de especies), la diversidad H1 (exponencial del índice de Shannon) y la diversidad H2 (el inverso del índice de Simpson) (JOST, 2006; MORENO *et al.*, 2011; CASAS-PINILLA *et al.*, 2017). Se estimó la riqueza del muestreo por medio de los estimadores no paramétricos de Chao1, el cual analiza la riqueza cuando se obtiene la abundancia a partir de las especies observadas con una y dos muestras (singletons y doubletons) (MORENO, 2001; MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011). Además, se realizó una curva de acumulación de especies y una curva de rarefacción utilizando los sitios de muestreo como variable independiente y como variable dependiente las especies recolectadas (MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; URBANO *et al.*, 2014; ISERHARD *et al.*, 2017). Los patrones de abundancia de las especies se estimaron a partir de una matriz de abundancias, donde se estableció la curva de rangos de abundancias para el ensamblaje de mariposas, y de esta forma poder conocer que especies son más dominantes y cuales son raras (singletons y doubletons) en la muestra. Finalmente, se realizó una prueba de U-Mann Whitney (Test de Kolmogorov-Smirnov: p-value= 0.0002) para determinar la significancia entre la variación temporal de altas y bajas lluvias (ZAR, 1996). Todos los análisis se precisaron bajo un nivel de significancia del 95% ( $p > 0,05$ ) y se realizaron utilizando los programas Biodiversity Pro (MCALEECE *et al.*, 1997) y SPSS (Statistical Productand Service Solutions Statistics) versión 17.0. (IBM, 2008).

**Resultados**

Se recolectaron 698 individuos, 6 familias, 15 subfamilias y 96 especies en ambas épocas (Apéndice I). En donde la familia Nymphalidae fue la más diversa tanto para la época de altas y bajas lluvias seguido de la familia Pieridae. Por su parte, las familias menos diversas fueron Papilionidae, Hesperidae, Lycaenidae y Riodinidae, siendo Lycaenidae y Riodinidae las familias que presentaron los menores valores de abundancia y riqueza en ambas épocas de muestreo (Figuras 2 y 3).



**Figura 2.**– Abundancia en mariposas a nivel de familias para altas y bajas lluvias en la microcuenca la Calabozza.



En cuanto a las subfamilias, Biblidinae y Nymphalinae (Nymphalidae) presentaron mayor riqueza y abundancia durante el estudio; subfamilias como Hesperinae (Hesperiiidae), Danaiinae (Nymphalidae) y Pierinae (Pieridae) fueron las menos representativas en la muestra tanto para la época de baja y alta lluvias (Figuras 4 y 5). Por su parte, en época de altas lluvias se recolectaron 386 individuos y 312 en bajas lluvias, aunque no se observaron diferencias significativas en términos de abundancia por época de muestreo en las subfamilias (U-Mann-Whitney:  $p=0.236$ )

Además, se observó una variación en la composición de las especies de mariposas en ambas épocas de muestreo, por ejemplo: *Pyrgus orcus* (Stoll, 1780), *Memphis ambrosia* (Druce, 1874), *Eresia clara* (Linnaeus, 1758), *Cissia tiessa* (Doubleday, 1848), *Quasimellana* sp., *Euptoieta claudia* (Cramer, 1775), *Taygetis rufomarginata* (Staudinger, 1888), *Aphrissa statira* (Cramer, 1777), *Melete polyhymnia* (Felder & Felder, 1865) y *Hypoleria ocalea* (Doubleday, 1847) sólo se encontraron en la época de bajas lluvias, para un total de 11 especies exclusivas para la época de baja lluvias. Por su parte, se observaron 13 especies de mariposas únicas para la época de alta lluvias: *Pyrgus oileus* (Linnaeus, 1767), *Eueides lybia* (Fabricius, 1775), *Itaballia demophile* (Linnaeus, 1763), *Dircenna dero* (Hübner, 1823), *Hamadryas arinome* (Lucas, 1853), *Taygetis andromeda* (Butler, 1877), *Eunica malvina* (Bates, 1864), *Posttaygetis penelea* (Cramer, 1777), *Smyrna blomfieldia* (Fabricius, 1781), *Dircenna dero* (Hübner, 1823), *Prepona laertes* (Hübner, 1811), *Pyrrhogyra crameri* (Aurivillius, 1882) y *Hamadryas laodamia* (Cramer, 1777) (Apéndice I).

Por otro lado, se observó que la mayoría de especies de mariposas (72 especies) se presentaron tanto para la época de baja y altas lluvias, tales como: *Urbanus dorantes* (Stoll, 1790), *Hamadryas feronia* (Linnaeus, 1758), *Dynamine racidula* (Hewitson, 1852), *Dryas iulia* (Fabricius, 1775), *Marpesia petreus* (Cramer, 1776), *Fountainea ryphea* (Cramer, 1775), *Historis odius* (Fabricius, 1775), *Siproeta*




Figura 4.- Riqueza de especies por subfamilia de mariposas diurnas presentes en la microcuenca la Calaboz, Casanare, Colombia.





Figura 5.- Abundancia de mariposas a nivel de subfamilias para la época de altas y bajas lluvias.

*epaphus* (Latreille, 1813), *Taygetis laches* (Fabricius, 1793), entre otras (Apéndice I). También, se observó que para ambas épocas hay una dominancia de algunas especies de mariposas en la muestra, como se puede constatar con los resultados de los rangos de abundancia (Figura 6), en donde la especie *Historis acheronta* (Fabricius, 1775) y *Heliconius erato* (Linnaeus, 1758) fueron las especies co-dominantes, tanto para época de baja y alta lluvias (Apéndice II).



**Figura 6.**– Rangos de abundancia de especies en cada época de muestreo.

Según los estimativos de diversidad, se puede inferir que el valor del estimativo de los Números de Hill de orden H0 y H1 es mayor para la época de Bajas Lluvias, lo que significa que hay una mayor riqueza y diversidad en esta época en comparación con la época de Altas Lluvias, presentándose una mayor dominancia según el orden H2 en la época de Altas Lluvias (Tabla I). No obstante, el valor del orden H0 presenta valores más altos en relación con el orden H1 y H2, indicando que este ensamblaje presenta algunas especies abundantes y un gran número de especies raras para cada punto, lo que se corrobora con los resultados de los rangos de abundancias de especies (Figura 6).

**Tabla I.**– Estimativos de Diversidad basado en Número de Hill o de especies efectivas para cada época de muestreo.

Estimativo	Altas Lluvias	Bajas Lluvias
Hill's Number H0	83	86
Hill's Number H1	24.211	38.292
Hill's Number H2	16.321	8.974
Chao1	98.95	130.22

Al observar la curva de rarefacción se puede inferir que la riqueza esperada a partir de la observada aún es alta, lo que, a su vez, permite evidenciar que el esfuerzo de muestreo no fue suficiente, ya que la curva no se vuelve asintótica para ambas muestras (Figura 7). Lo anterior es corroborado por el estimativo no paramétrico de Chao1 (Tabla I), puesto que el valor estimado es mayor que el observado, lo que sugiere que con un mayor tiempo de muestreo se podrá obtener una mayor riqueza de mariposas para ambas épocas de muestreo, especialmente para la época de bajas lluvias.




Figura 7.– Curva de rarefacción para los periodos de alta y bajas lluvias.

En cuanto a la curva de acumulación de especies (Figura 8), se observa que para ambas épocas de muestreo el esfuerzo de muestreo y la representatividad del mismo está entre un 80.6%-83.8%, por lo que la diversidad registrada para cada una de las muestras estuvo bien representada en el estudio a pesar de no llegar a un 100% de efectividad. Lo que permite inferir que, al igual que con la riqueza esperada, con un mayor tiempo de muestreo se podría llegar a obtener una mayor representatividad de especies de mariposas en el área de estudio según las épocas de muestreo.




Figura 8.– Curva de acumulación de especies en la microcuenca la Calaboz, Casanare, Colombia.

## Discusión

El patrón de actividad estacional registrado para la mayoría de las especies de mariposas y su relación con la precipitación (baja y altas lluvias), es un patrón que ha sido documentado también para otros grupos de insectos, como Coleópteros (PESCADOR *et al.*, 2002; NOGUERA *et al.*, 2007; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009; MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; ISERHARD *et al.*, 2017). Este patrón parece estar relacionado a la época reproductiva y a la disponibilidad de recursos en el hábitat (JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009). Por lo tanto, la actividad reproductiva de las especies de mariposas y otros grupos de insectos que mantienen una estrecha relación con las plantas como posibles hospederas o de refugio, estaría sincronizada con el tiempo de mayor disponibilidad de recursos para el desarrollo de sus larvas (JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009; URBANO *et al.*, 2014; RIBEIRO *et al.*, 2016).

Sin embargo, también se presentaron especies como *Historis acheronta* (Fabricius, 1775), *Heliconius erato* (Linnaeus, 1758), *Urbanus proteus* (Linnaeus, 1758), *Dynamine racidula* (Hewitson, 1852), entre otras, las cuales estuvieron activas durante ambas épocas de muestreo y que aparentemente no siguen el patrón estacional de otras especies que sólo se presentaron en alguna época de muestreo, como *Pyrrhogyra cramerii* (Aurivillius, 1882) y *Cissia tiessa* (Doubleday, 1848) (Apéndice I). Esta posible falta de estacionalidad de estas especies puede ser explicada por las preferencias de hábitat y los recursos alimenticios que estas especies explotan y que pueden verse afectadas por las condiciones de humedad visto desde una escala local (JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009). Es posible que las especies de mariposas que se presentaron únicamente tanto para la época de lluvias y de bajas lluvias, podrían ser consideradas univoltinas y esta es una posible explicación de que estén presentes sólo en alguna época del año, como sucede en coleópteros estafilínidos (JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009). No obstante, lo anterior no puede probarse en este estudio, aunque datos de MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, (2011) en mariposas Pronophilina y en especies de coleópteros de la familia Lampyridae y otros grupos de insectos con requerimientos de hábitat similares, parecen apoyar esta hipótesis (ZARAGOZA-CABALLERO *et al.*, 2003; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009).

Por otra parte, se ha demostrado que, a una escala local, variables ambientales como la altitud, la pendiente, la insolación y la capacidad de retención de agua del suelo, entre otras, pueden explicar cambios en la estructura y composición de la vegetación (DURÁN *et al.*, 2002; JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009; MAHECHA-JIMÉNEZ *et al.*, 2011; CASAS-PINILLA *et al.*, 2017), lo que probablemente también afectaría la comunidad heterótrofa presente. En el caso de la región de estudio, la topografía es muy irregular y ello probablemente afecta las variables ambientales mencionadas anteriormente y origina una gran variedad de microhábitats con diferencias en estructura y composición de especies de flora y fauna (JIMÉNEZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2009; NAUJOKAITIS-LEWIS & FORTIN, 2016), lo que ocasiona una variación en la representatividad de las especies de mariposas en ambas épocas de muestreo, generando especies dominantes y especies raras en ciertas épocas del año.

A su vez, SHAPIRO *et al.* (2003) y ISERHARD *et al.* (2017) demostraron que la distribución temporal y diversidad de mariposas exhibe una gran variación entre diferentes épocas del año en relación con la fenología y la estacionalidad de estos insectos, por lo que la riqueza de especies y abundancia baja observada en algunas familias de mariposas como Lycaenidae y Riodinidae fueron probablemente debido a estas diferencias. Además, la dinámica en la estacionalidad afectará directamente a la biología de los inmaduros y mariposas adultas (ISERHARD *et al.*, 2017). Estas dinámicas pueden explicarse por la extinción local, recolonización y/o por la migración a otros sitios o regiones en latitudes más bajas con mayor y más constante temperatura y con condiciones climáticas más favorables (ISERHARD *et al.*, 2017). No obstante, los períodos muestreados en el presente estudio posiblemente no son suficientes para comprobar estos cambios en la dinámica poblacional de las especies de mariposas en el área de estudio.

El empleo de los datos obtenidos en los estudios de variación temporal son fundamental para las estrategias de conservación, ya que esta información permite saber si las especies de mariposas están desapareciendo o si simplemente están migrando a otras zonas geográficas con condiciones abióticas y bióticas más favorables y si la planificación de la conservación está siendo efectiva por parte de las entidades gubernamentales encargadas de los procesos de conservación en el país (MAGURRAN, 2011; ISERHARD *et al.*, 2017). La política pública también se beneficia de cierta manera, con la incorporación de información cien-

tífica relacionada con el mantenimiento de hábitats y la integridad de los biomas y su fauna asociada en el proceso de toma de decisiones para la conservación de especies y ecosistemas. Finalmente, este estudio aporta al conocimiento de cómo la variación temporal afecta a los ensamblajes de mariposas en la Orinoquía colombiana, como también contribuyendo a la composición de las especies de la región del Casanare en Colombia.

## Agradecimientos

Los autores desean expresarle sus agradecimientos a la Fundación Universitaria Unitrópico por la financiación (Convocatoria Número 002-2016) del presente estudio. A todos los especialistas nacionales e internacionales que contribuyeron en la corroboración de las especies de Lepidoptera.

## BIBLIOGRAFÍA

- ANDRADE-C., M. G., 2011.– Estado del conocimiento de la Biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ciencia-política.– *Revista Academia Colombiana de Ciencias*, **35**(137): 491-507.
- ANDRADE-C., M. G., HENAO-BAÑOL, E. R. & TRIVIÑO, P., 2013.– Técnicas y procesamiento para la recolección, preservación y montaje de mariposas en estudios de biodiversidad y conservación (Lepidoptera: Hesperioidea-Papilionoidea).– *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias*, **37**(144): 311-325.
- BAPTISTE, M. P., CASTAÑO, N., CÁRDENAS, L. D., GUTIÉRREZ, F. P., GIL, D. L. & LASSO, C. A., 2010.– *Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia*: 56 pp. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C.
- BROWN, Jr. K. S., 1991.– Conservation of Neotropical paleoenvironments: Insects as indicators.– *In* N. M. COLLINS & J. A. THOMAS (Eds). *Conservation of Insects and their Habitats*: 349-404. London.
- CASAS-PINILLA, L. C., MAHECHA-J., O., DUMAR-R., J. C. & RÍOS-MÁLAVAR, I. C., 2017.– Diversidad de mariposas en un paisaje de bosque seco tropical, en la Mesa de los Santos, Santander, Colombia (Lepidoptera: Papilionoidea).– *SHILAP Revista de lepidopterología*, **45**(177): 83-108.
- CODESIDO, M. & BILENCA, D. N., 2004.– Variación estacional de un ensamble de aves en un bosque subtropical semiárido del Chaco Argentino.– *Biotropica*, **36**: 544-554.
- DURÁN, E., BALVANERA, P., LOTT, E., SEGURA, G., PÉREZ-JIMÉNEZ, A., ISLAS, Á. & FRANCO, M., 2002.– Estructura, composición y dinámica de la vegetación.– *In* F. A. NOGUERA, J. H. VEGA-RIVERA, A. N. GARCÍA-ALDRETE & M. QUESADA-AVENDAÑO (eds.). *Historia Natural de Chamela*: 443-472. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- FAGUA, G., AMARILLO, A. & ANDRADE-C., M. G., 1999.– Mariposas (Lepidoptera) como bioindicadores del grado de intervención en la cuenca del río Pato (Caquetá).– *In* M. G. ANDRADE, G. AMAT & F. FERNÁNDEZ (eds). *Insectos de Colombia*: 285-315. Estudios Escogidos. Colección Jorge Álvarez Lleras. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá.
- GONZÁLEZ-VALDIVIA, N., OCHOA-GAONA, S., POZO, C., FERGUSON, F. G., RANGEL-RUIZ, L. J., ARRIGA-WEISS, S. L., PONCE-MENDOZA, A. & KAMPICHLER, C., 2011.– Indicadores ecológicos de hábitat y biodiversidad en un paisaje Neotropical: perspectiva multi-taxonómica.– *Revista Biología Tropical*, **59**(3): 1433-1451.
- GUERRA-SERRUDO, J. F. & LEDEZMA-ÁRIAS, J., 2008.– Biología y morfología de *Morpho menelaus godartii* (Lepidoptera: Nymphalidae: Morphinae) en el Parque Nacional Cotapata Bolivia.– *Ecología en Bolivia*, **43**(1): 40-52.
- GREENEY, H. F., PYRCZ, T. W., DEVRIES, P. J. & DYER, L. A., 2009.– The early stages of *Pedaliodes poesia* (Hewitson, 1862) in eastern Ecuador (Lepidoptera: Satyrinae: Pronophilini).– *Journal of Insect Science*, **9**: 1-8
- IBM-SPSS Inc. Released 2008.– *SPSS Statistics for Windows*, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.
- ISERHARD, C. A., PICCOLI-ROMANOWSKI, H., RICHTER, A. & MILTON DE SOUZA MENDONÇA, JR., 2017.– Monitoring Temporal Variation to Assess Changes in the Structure of Subtropical Atlantic Forest Butterfly Communities.– *Environmental Entomology*, **46**(4): 804-813. <https://doi.org/10.1093/ee/nvx115>
- JOST, L., 2006.– Entropy and diversity.– *Oikos*, **113**: 363-375.
- KATO, M., INOUE, T., HAMID, A. A., NAGAMITSU, T., MERDEK, M. B., NONA, A. R., ITINO, T., YAMANE, S. & YUMOTO, T., 1995.– Seasonality and vertical structure of light-attracted insect communities in a dipterocarp forest in Sarawak.– *Researches on Population Ecology*, **37**: 59-79.

- LAMAS, G., 2004.– *Atlas of Neotropical Lepidoptera, Checklist: Part 4A, Hesperioidea-Papilionoidea*: 439 pp. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville.
- LE CROM, J. F., CONSTANTINO, L. M. & SALAZAR, J. A., 2002.– *Mariposas de Colombia. Papilionidae*, 1: 119 pp. Carlec Ltda. Bogotá.
- LE CROM, J. F., CONSTANTINO, L. M. & SALAZAR, J. A., 2004.– *Mariposas de Colombia. Pieridae*, 2: 113 pp. Carlec Ltda. Bogotá.
- MAGURRAN, A. E., 2011.– Measuring biological diversity in time (and space): 85-96.– In A. E. MAGURRAN & B. J. MCGILL (eds.). *Biological Diversity: Frontiers in measurement and assessment*: 368 pp. Oxford University Press, Oxford.
- MAHECHA-JIMÉNEZ, O. J., DUMAR-RODRÍGUEZ, J. C. & PYRCZ T. W., 2011.– Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de Lepidoptera de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogotá (Colombia) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).– *SHILAP Revista de lepidopterología*, 39(153): 117-126.
- MAHECHA-J., O. & DÍAZ-S., V., 2015.– Aproximación a la diversidad taxonómica de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) en la Vereda Cafreña, Municipio Icononzo, Tolima.– *Revista Científica Unincca*, 20(2): 83-91.
- MCALLEECE, N., GAGE, J. D. G., LAMBSHEAD, P. J. D. & PATERSON, G. L. J., 1997.– *Biodiversity Professional statistics analysis software*. Jointly developed by the Scottish Association for Marine Science and the Natural History Museum, London.
- MORENO, C. E., 2001.– *Métodos para medir la biodiversidad*: 84 pp. Manuales y Tesis, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza.
- MORENO, C. E., BARRAGÁN, F., PINEDA, E. & PAVÓN, N. P., 2011.– Reanálisis de la diversidad alfa: alternativas para interpretar y comparar información sobre comunidades ecológicas.– *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 82: 1249-1261.
- NAUJOKAITIS-LEWIS, I. & FORTIN, M. J., 2016.– Spatio-temporal variation of biotic factors underpins contemporary range dynamics of congeners.– *Global change biology*, 22(3): 1201-1213.
- NEILD, A., 1996.– *The butterflies of Venezuela. Nymphalidae I (Limenitidinae, Apaturinae, Charaxinae)*, 1: 144 pp. Meridian Publications, Greenwich, London.
- NEILD, A., 2008.– *The butterflies of Venezuela. Nymphalidae II (Acraeinae, Libytheinae, Nymphalinae, Ithomiinae and Morphinae)*, 2: 144 pp. Meridian Publications Greenwich, London.
- NOGUERA, F. A., CHEMSAK, J. A., ZARAGOZA-CABALLERO, S., RODRÍGUEZ-PALAFIX, A., RAMÍREZ-GARCÍA, E., GONZÁLEZ-SORIANO, E. & AYALA, R., 2007.– A faunal study of Cerambycidae (Coleoptera) from one region with tropical dry forest in Mexico: San Buenaventura, Jalisco.– *The Pan-Pacific Entomologist*, 83: 296-314.
- PESCADOR-RUBIO, A., RODRÍGUEZ-PALAFIX, A. & NOGUERA, F. A., 2002.– Diversidad y estacionalidad de Arthropoda.– In F. A. NOGUERA, J. H. VEGA-RIVERA, A. N. GARCÍA-ALDRETE & M. QUESADA-AVENDAÑO (eds.). *Historia Natural de Chamela*: 183-201. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- RIBEIRO, D. B., WILLIAMS, M. R., SPECHT, A. & FREITAS, A. V., 2016.– Vertical and temporal variability in the probability of detection of fruit-feeding butterflies and moths (Lepidoptera) in tropical forest.– *Austral Entomology*, 55(1): 112-120.
- ROMERO, M., GALINDO, G., OTERO, J. & ARMENTERAS, D., 2004.– *Ecosistemas de la cuenca del Orinoco Colombiano*: 189 pp. Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá.
- RUDAS, G., DARWIN, M., ARMENTERAS, D., RODRÍGUEZ, N., MORALES, M., DELGADO, L. C. & SARMIENTO, A., 2007.– *Biodiversidad y actividad humana: relaciones en ecosistemas de bosque subandino en Colombia*: 128-130 pp. Instituto de Investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá.
- SANTOS, T. & TELLERÍA, J. L., 2006.– Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies.– *Ecosistemas*, 15(2): 3-12
- SHAPIRO, A. M., VANBUSKIRK, R., KAREOFELAS, G. & PATTERSON, W. D., 2003.– Phenophaunistics: Seasonality as a property of butterfly faunas: 111-148.– In C. L. BOGGS, W. B. WATT & P. EHRLICH (eds). *Butterflies: ecology and evolution taken flight*: 756 pp. The University of Chicago Press, Chicago.
- URBANO, P., MAHECHA, J. O. & HINCAPIE, E., 2014.– Diversidad y estructura de las comunidades de Lepidoptera en la zona de ecotono entre el piedemonte llanero y sabana inundable en Casanare-Colombia (Lepidoptera: Papilionoidea).– *SHILAP Revista de lepidopterología*, 167(42): 433-437.
- VAN DER HAMMEN, T. & ANDRADE, G., 2003.– *Estructura Ecológica Principal de Colombia (primera aproximación)*: 74 pp. Ministerio de Ambiente e Ideam, Bogotá, Colombia.
- WARREN, D., DAVIS, J., STANGELAND, M., PELHAM, J. & GRISHIN, N., 2013.– Illustrated Lists of American Butterflies. Disponible en <http://www.butterfliesofamerica.com/> (accedido el 18 de mayo de 2017).
- WOLDA, H., 1978.– Fluctuations in abundance of tropical insects.– *The American Naturalist*, 112: 1017-1045
- ZAR, J. H., 1996.– *Biostatistical analysis*: 663 pp. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

ZARAGOZA-CABALLERO, S., NOGUERA, F. A., CHEMSAK, J. A., GONZÁLEZ-SORIANO, E., RODRÍGUEZ-PALAFOX, A., RAMÍREZ-GARCÍA, E. & AYALA, R., 2003.– Diversity of Lycidae, Phengodidae, Lampyridae, and Cantharidae (Coleoptera) in a tropical dry forest region in Mexico: Sierra de Huautla, Morelos.– *The Pan-Pacific Entomologist*, 7: 3-37.

P. U., E. S., V. I.  
Grupo de Investigaciones Biológicas de la Orinoquia GINBIO  
Unitrópico  
Carrera 19, N° 39-40  
6320700. Yopal- Casanare  
COLOMBIA / COLOMBIA  
E-mail: plurbanus@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0001-8564-3854>

\*O. M. J., V. D. S.  
Zoological Division of the Nature Education Centre  
Jagiellonian University  
Gronostajowa, 5  
PL-30-387 Kraków  
POLONIA / POLAND  
E-mail: oscarmahecha23@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0002-8682-0020>

O. M. J.  
Instituto de Ciencias Naturales  
Universidad Nacional de Colombia  
Carrera 30 No. 45-03  
Bogotá D. C.  
COLOMBIA / COLOMBIA

O. M. J.  
Grupo en Ecología Evolutiva y Biogeografía Tropical ECOBIT  
Universidad Incca de Colombia  
Carrera 13, N° 24-16  
Bogotá D. C.  
COLOMBIA / COLOMBIA

V. D. S.  
Semillero en Biogeografía y Ecología Evolutiva Neotropical BEEN  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Carrera 3, N° 26 A-40  
Bogotá D. C.  
COLOMBIA / COLOMBIA  
E-mail: diazsvane@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0003-2938-2324>

\*Autor para la correspondencia / *Corresponding author*

(Recibido para publicación / *Received for publication* 6-IV-2018)

(Revisado y aceptado / *Revised and accepted* 20-V-2018)

(Publicado / *Published* 30-XII-2018)

**Apéndice I.**– Composición y Abundancia de Mariposas Papilionoidea en cada época de muestreo en la cueca Colosal, Casanare, Colombia. El 0 representa ausencia y 1 presencia de la especie por época de muestreo.

ESPECIES	PERIODO DE MUESTREO		INDIVIDUOS POR ESPECIE
	ALTAS LLUVIAS	BAJAS LLUVIAS	
<b>HESPERIIDAE</b>			
<b>Hesperinae</b>			
<i>Atalopedes sp.</i>	1	1	2
<i>Pelopidas sp.</i>	1	1	2
<i>Quasimellana sp.</i>	0	1	3
<b>Pyrginae</b>			
<i>Heliopetes sp.</i>	1	1	2
<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	0	1	4
<i>Pyrgus oileus</i> (Linnaeus, 1767)	1	0	2
<i>Urbanus dorantes</i> (Stoll, 1790)	1	1	5
<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	2
<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	1	1	3
<b>LYCAENIDAE</b>			
<b>Theclinae</b>			
<i>Calycopis sp.</i>	1	1	2
<i>Ministrymon sp.</i>	1	1	5
<i>Pseudolycaena damo</i> (Druce, 1875)	1	1	3
<b>NYMPHALIDAE</b>			
<b>Biblidinae</b>			
<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)	1	1	5
<i>Callicore pitheas</i> (Latreille, 1813)	1	1	20
<i>Callicore cyllene</i> (Doubleday, 1847)	1	1	6
<i>Diaethria clymena marchalii</i> (Guérin-Méneville, 1844)	1	1	6
<i>Dynamine racidula</i> (Hewitson, 1852)	1	1	4
<i>Eunica malvina</i> (Bates, 1864)	1	0	2
<i>Eunica pusilla</i> (Bates, 1864)	1	0	3
<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	23
<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	1	1	13
<i>Hamadryas arinome</i> (Lucas, 1853)	1	0	16
<i>Hamadryas laodamia</i> (Cramer, 1777)	1	0	5
<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	1	1	4
<i>Nica flavilla</i> (Godart, 1824)	1	1	7
<i>Pyrrhogyra crameri</i> (Aurivillius, 1882)	1	0	3
<i>Pyrrhogyra neaerea</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	3
<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1777)	1	1	4
<b>Charaxinae</b>			
<i>Agrias amydon</i> (Hewitson, 1854)	1	1	4
<i>Archaeoprepona demophoon</i> (Hübner, 1814)	1	1	8
<i>Consul fabius</i> (Cramer, 1776)	1	1	6
<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1775)	1	1	7
<i>Hypna clytemnestra</i> (Cramer, 1777)	1	1	6
<i>Memphis glaucone</i> (Felder & Felder, 1862)	1	1	4

<i>Memphis ambrosia</i> (Druce, 1874)	0	1	1
<i>Prepona laertes</i> (Hübner, 1811)	1	0	6
<i>Siderone galanthis</i> (Cramer, 1775)	1	1	13
<i>Zaretis ellops</i> (Ménétriés, 1855)	1	1	6
<b>Danaïinae</b>			
<i>Ceratinia tutia</i> (Hewitson, 1852)	1	1	5
<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	7
<i>Dircenna dero</i> (Hübner, 1823)	1	0	2
<i>Hypoleria ocalea</i> (Doubleday, 1847)	0	1	4
<i>Ithomia iphianassa</i> (Doubleday, 1847)	1	1	4
<i>Lycorea halia cleobae</i> (Godart, 1819)	1	1	4
<i>Mechanitis polynnia</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	22
<i>Melinaea marsaeus</i> (Hewitson, 1860)	1	1	4
<i>Tithorea harmonia</i> (Cramer, 1777)	1	1	8
<b>Heliconiinae</b>			
<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	1	1	4
<i>Eueides lybia</i> (Fabricius, 1775)	1	0	1
<i>Euptoieta claudia poasina</i> (Cramer, 1775)	0	1	1
<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	44
<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	1	1	6
<b>Limenitidinae</b>			
<i>Adelpha cocala</i> (Cramer, 1779)	1	1	4
<i>Adelpha alala</i> (Hewitson, 1847)	1	1	4
<i>Adelpha iphicles</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	2
<b>Nymphalinae</b>			
<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	1	1	12
<i>Anartia amathea</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	17
<i>Chlosyne lacinia</i> (Geyer, 1837)	1	1	2
<i>Chlosyne hippodrome</i> (Geyer, 1837)	1	1	5
<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	2
<i>Eresia clara</i> (Linnaeus, 1758)	0	1	2
<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775)	1	1	12
<i>Historis acheronta</i> (Fabricius, 1775)	1	1	91
<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	1	1	5
<i>Pycina zamba</i> (Doubleday, 1849)	1	1	7
<i>Siproeta stelenes biplagiata</i> (Fruhstorfer, 1907)	1	1	9
<i>Siproeta epaphus</i> (Latreille, 1813)	1	1	3
<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)	1	0	2
<b>Satyrinae</b>			
<i>Caligo illioneus</i> (Cramer, 1775)	1	1	9
<i>Catoblepia amphirhoe</i> (Hübner, 1825)	1	1	2
<i>Cissia tiessa</i> (Doubleday, 1848)	0	1	2
<i>Morpho menelaus</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	23
<i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776)	1	1	3
<i>Opsiphanes quiteria</i> (Stoll, 1780)	1	1	4
<i>Pierella lamia</i> (Sulzer, 1776)	1	1	5
<i>Posttaygetis penelea</i> (Cramer, 1777)	1	0	1

<i>Taygetis laches</i> (Fabricius, 1793)	1	1	8
<i>Taygetis sp.</i>	0	1	1
<i>Taygetis rufomarginata</i> (Staudinger, 1888)	0	1	2
<i>Taygetis andromeda</i> (Butler, 1877)	1	0	3
<b>PAPILIONIDAE</b>			
<b>Papilioninae</b>			
<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	1	1	10
<i>Heraclides thoas</i> (Linnaeus, 1771)	1	1	7
<i>Parides eurimedes</i> (Stoll, 1782)	1	1	7
<i>Parides erithalion</i> (Boisduval, 1836)	1	1	6
<b>PIERIDAE</b>			
<b>Coliadinae</b>			
<i>Anteos clorinde</i> (Godart, 1824)	1	1	5
<i>Aphrissa statira</i> (Cramer, 1777)	0	1	1
<i>Eurema xantachlora</i> (Kollar, 1850)	1	1	10
<i>Eurema दौरa</i> (Godart, 1819)	1	1	2
<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	1	1	21
<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	1	1	8
<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	1	1	23
<b>Pierinae</b>			
<i>Itaballia demophile</i> (Linnaeus, 1763)	1	0	2
<i>Melete polyhymnia</i> (Felder & Felder, 1865)	0	1	3
<b>RIODINIDAE</b>			
<b>Riodininae</b>			
<i>Ancyluris aulestes</i> (Cramer, 1777)	1	1	8
<i>Rethus sp.</i>	1	1	4
<i>Riodina lysippoides</i> (Berg, 1882)	1	1	3
<b>TOTAL INDIVIDUOS</b>			<b>698</b>

**Apéndice II.**– Rango de Abundancias de especies para la época de muestreo de Altas y Bajas Lluvias.

<b>Especie</b>	<b>Altas Lluvias</b>	<b>Especie</b>	<b>Bajas Lluvias</b>
<i>Historis acheronta</i> (Fabricius, 1775)	63	<i>Historis acheronta</i> (Fabricius, 1775)	28
<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)	24	<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)	20
<i>Morpho menelaus</i> (Linnaeus, 1758)	18	<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)	18
<i>Hamadryas arinome</i> (Lucas, 1853)	16	<i>Mechanitis polymnia</i> (Linnaeus, 1758)	13
<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	12	<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	12
<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	11	<i>Callicore pitheas</i> (Latreille, 1813)	11
<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	11	<i>Anartia amathea</i> (Linnaeus, 1758)	10
<i>Callicore pitheas</i> (Latreille, 1813)	9	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	10
<i>Siderone galanthis</i> (Cramer, 1775)	9	<i>Siproeta stelenes biplagiata</i> (Fruhstorfer, 1907)	7
<i>Mechanitis polymnia</i> (Linnaeus, 1758)	9	<i>Taygetis laches</i> (Fabricius, 1793)	7
<i>Anartia amathea</i> (Linnaeus, 1758)	7	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	7
<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775)	7	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	6
<i>Nica flavilla</i> (Godart, 1824)	6	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	6
<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1775)	6	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	6
<i>Prepona laertes</i> (Hübner, 1811)	6	<i>Morpho menelaus</i> (Linnaeus, 1758)	5
<i>Tithorea harmonia</i> (Cramer, 1777)	6	<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775)	5
<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	6	<i>Pycina zamba</i> (Doubleday, 1849)	5
<i>Eurema xantachlora</i> (Kollar, 1850)	6	<i>Parides eurimedes</i> (Stoll, 1782)	5
<i>Callicore cyllene</i> (Doubleday, 1847)	5	<i>Ancyluris aulestes</i> (Cramer, 1777)	5
<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)	5	<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	4
<i>Hamadryas laodamia</i> (Cramer, 1777)	5	<i>Urbanus dorantes</i> (Stoll, 1790)	4
<i>Consul fabius</i> (Cramer, 1776)	5	<i>Ministrymon</i> sp.	4
<i>Caligo illioneus</i> (Cramer, 1775)	5	<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)	4
<i>Archaeoprepona demophoon</i> (Hübner, 1814)	4	<i>Archaeoprepona demophoon</i> (Hübner, 1814)	4
<i>Hypna clytemnestra</i> (Cramer, 1777)	4	<i>Siderone galanthis</i> (Cramer, 1775)	4
<i>Ceratinia tutia</i> (Hewitson, 1852)	4	<i>Hypoleria ocalea</i> (Doubleday, 1847)	4
<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	4	<i>Caligo illioneus</i> (Cramer, 1775)	4
<i>Chlosyne hippodrome</i> (Geyer, 1837)	4	<i>Parides erithalion</i> (Boisduval, 1836)	4
<i>Heraclides thoas</i> (Linnaeus, 1771)	4	<i>Eurema xantachlora</i> (Kollar, 1850)	4
<i>Anteos clorinde</i> (Godart, 1824)	4	<i>Quasimellana</i> sp.	3
<i>Diaethria clymena marchalii</i> (Guérin-Méneville, 1844)	3	<i>Diaethria clymena marchalii</i> (Guérin-Méneville, 1844)	3
<i>Dynamine racidula</i> (Hewitson, 1852)	3	<i>Memphis glaucone</i> (Felder & Felder, 1862)	3
<i>Eunica pusilla</i> (Bates, 1864)	3	<i>Zaretis ellops</i> (Ménétriés, 1855)	3
<i>Pyrrhogyra crameri</i> (Aurivillius, 1882)	3	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	3
<i>Agrias amydon</i> (Hewitson, 1854)	3	<i>Heraclides thoas</i> (Linnaeus, 1771)	3
<i>Zaretis ellops</i> (Ménétriés, 1855)	3	<i>Melete polyhymnia</i> (Felder & Felder, 1865)	3
<i>Lycorea halia cleobae</i> (Godart, 1819)	3	<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	2
<i>Ithomia iphianassa</i> (Doubleday, 1847)	3	<i>Pseudolycaena damo</i> (Druce, 1875)	2
<i>Adelpha cocala</i> (Cramer, 1779)	3	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	2
<i>Pierella lamia</i> (Sulzer, 1776)	3	<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1777)	2
<i>Taygetis andromeda</i> (Butler, 1877)	3	<i>Hypna clytemnestra</i> (Cramer, 1777)	2
<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	3	<i>Melinaea marsaeus</i> (Hewitson, 1860)	2
<i>Ancyluris aulestes</i> (Cramer, 1777)	3	<i>Tithorea harmonia</i> (Cramer, 1777)	2
<i>Pyrgus oilus</i> (Linnaeus, 1767)	2	<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	2
<i>Eunica malvina</i> (Bates, 1864)	2	<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	2
<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	2	<i>Adelpha alala</i> (Hewitson, 1847)	2
<i>Pyrrhogyra neaerea</i> (Linnaeus, 1758)	2	<i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776)	2
<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1777)	2	<i>Opsiphanes quiteria</i> (Stoll, 1780)	2
<i>Dircehna cero</i> (Hübner, 1823)	2	<i>Eresia clara</i> (Linnaeus, 1758)	2

<i>Melinaea marsaeus</i> (Hewitson, 1860)	2	<i>Cissia tiessa</i> (Doubleday, 1848)	2
<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	2	<i>Pierella lamia</i> (Sulzer, 1776)	2
<i>Adelpha alala</i> (Hewitson, 1847)	2	<i>Taygetis rufomarginata</i> (Staudinger, 1888)	2
<i>Opsiphanes quiteria</i> (Stoll, 1780)	2	<i>Rethus</i> sp.	2
<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	2	<i>Riodina lysippoides</i> (Berg, 1882)	2
<i>Pycina zamba</i> (Doubleday, 1849)	2	<i>Atalopedes</i> sp.	1
<i>Siproeta stelenes biplagiata</i> (Fruhstorfer, 1907)	2	<i>Pelopidas</i> sp.	1
<i>Siproeta epaphus</i> (Latreille, 1813)	2	<i>Heliopetes arsalte</i> (Billberg, 1820)	1
<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)	2	<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Parides eurimedes</i> (Stoll, 1782)	2	<i>Calycopis isobeo</i> (Scudder, 1876)	1
<i>Parides erithalion</i> (Boisduval, 1836)	2	<i>Callicore cyllene</i> (Doubleday, 1847)	1
<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	2	<i>Dynamine racidula</i> (Hewitson, 1852)	1
<i>Itaballia demophile</i> (Linnaeus, 1763)	2	<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	1
<i>Rethus</i> sp.	2	<i>Nica flavilla</i> (Godart, 1824)	1
<i>Atalopedes</i> sp.	1	<i>Pyrrhogyra neaerea</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Pelopidas</i> sp.	1	<i>Agrias amydon</i> (Hewitson, 1854)	1
<i>Heliopetes arsalte</i> (Billberg, 1820)	1	<i>Consul fabius</i> (Cramer, 1776)	1
<i>Urbanus dorantes</i> (Stoll, 1790)	1	<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1775)	1
<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>Memphis ambrosia</i> (Druce, 1874)	1
<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	1	<i>Lycorea halia cleobae</i> (Godart, 1819)	1
<i>Calycopis isobeo</i> (Scudder, 1876)	1	<i>Ceratinia tutia</i> (Hewitson, 1852)	1
<i>Ministrymon</i> sp.	1	<i>Ithomia iphianassa</i> (Doubleday, 1847)	1
<i>Pseudolycaena damo</i> (Druce, 1875)	1	<i>Euptoieta claudia poasina</i> (Cramer, 1775)	1
<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)	1	<i>Adelpha cocala</i> (Cramer, 1779)	1
<i>Memphis glaucone</i> (Felder & Felder, 1862)	1	<i>Adelpha iphichus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>Catoblepia amphirhoe</i> (Hübner, 1825)	1
<i>Eueides lybia</i> (Fabricius, 1775)	1	<i>Chlosyne lacinia</i> (Geyer, 1837)	1
<i>Adelpha iphichus</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>Chlosyne hippodrome</i> (Geyer, 1837)	1
<i>Catoblepia amphirhoe</i> (Hübner, 1825)	1	<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776)	1	<i>Siproeta epaphus</i> (Latreille, 1813)	1
<i>Chlosyne lacinia</i> (Geyer, 1837)	1	<i>Taygetis</i> sp.	1
<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>Anteos clorinde</i> (Godart, 1824)	1
<i>Posttaygetis penelea</i> (Cramer, 1777)	1	<i>Aphrissa statira</i> (Cramer, 1777)	1
<i>Taygetis laches</i> (Fabricius, 1793)	1	<i>Eurema daira</i> (Godart, 1819)	1
<i>Eurema daira</i> (Godart, 1819)	1	<i>Pyrgus oileus</i> (Linnaeus, 1767)	0
<i>Riodina lysippoides</i> (Berg, 1882)	1	<i>Eunica malvina</i> (Bates, 1864)	0
<i>Quasimellana</i> sp.	0	<i>Eunica pusilla</i> (Bates, 1864)	0
<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	0	<i>Hamadryas arinome</i> (Lucas, 1853)	0
<i>Memphis ambrosia</i> (Druce, 1874)	0	<i>Hamadryas laodamia</i> (Cramer, 1777)	0
<i>Hypoleria ocalea</i> (Doubleday, 1847)	0	<i>Pyrrhogyra crameri</i> (Aurivillius, 1882)	0
<i>Euptoieta claudia poasina</i> (Cramer, 1775)	0	<i>Prepona laertes</i> (Hübner, 1811)	0
<i>Eresia clara</i> (Linnaeus, 1758)	0	<i>Dircenna dero</i> (Hübner, 1823)	0
<i>Cissia tiessa</i> (Doubleday, 1848)	0	<i>Eueides lybia</i> (Fabricius, 1775)	0
<i>Taygetis</i> sp.	0	<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)	0
<i>Taygetis rufomarginata</i> (Staudinger, 1888)	0	<i>Posttaygetis penelea</i> (Cramer, 1777)	0
<i>Aphrissa statira</i> (Cramer, 1777)	0	<i>Taygetis andromeda</i> (Butler, 1877)	0
<i>Melete polyhymnia</i> (Felder & Felder, 1865)	0	<i>Itaballia demophile</i> (Linnaeus, 1763)	0